

SIGNES QUI DOIVENT NÉCESSITER D'APPELER UN MÉDECIN OU LE CENTRE 15 :

- Tremblements importants
- Agitation psychomotrice
- Changement de comportement
- Insomnie
- Délire, hallucination
- Vomissements



NOS COORDONNÉES

GAFC
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
 120, route nationale
 BP 100
 39100 DOLE
 Téléphone : 03 84 71 54 20
 E-Mail : contact@ga-fc.fr
 Site internet : ga-fc.fr



FICHE DE SUIVI INFIRMIER (IDE)

Nom du médecin :

Téléphone :

- ▶ Rechercher le nombre de comprimés pris, les signes de manque avec le score de CUSHMAN, évaluer l'hydratation, rechercher les effets secondaires des traitements institués.
- ▶ Avis médical à demander dès que le score de CUSHMAN est > à 6

Score de CUSHMAN

	0	1	2	3
Pouls (battements/min)	Moins de 80	De 81 à 100	De 101 à 120	Plus de 120
PA systolique				
De 18 à 30 ans	Moins de 125	De 126 à 135	De 136 à 145	Plus de 145
De 31 à 50 ans	Moins de 135	De 136 à 145	De 146 à 155	Plus de 155
Plus de 50 ans	Moins de 145	De 146 à 155	De 156 à 165	Plus de 165
Fréquence respiratoire	Moins de 16	De 16 à 25	De 26 à 35	Plus de 35
Tremblements	0	De la main en extension	Tout le membre supérieur	Généralisés
Sueurs	0	Paumes	Paumes et front	Généralisées
Agitation	0	Discrète	Généralisée et contrôlable	Généralisée et incontrôlable
Troubles sensoriels	0	Gêne par bruit ou lumière, prurit	Hallucinations critiquées	Hallucinations non critiquées
Total				

Hydratation en volume (nombre de verre)

Anxiété (échelle de 0 à 10)

Douleur (échelle de 0 à 10)

Nombre de comprimés de benzodiazépines	Score de CUSHMAN	Commentaires
		J 1 Matin
		J 1 Après-midi
		J 2 Matin (appel systématique de l'IDE au médecin)
		J 2 Après-midi
		J 3 Matin
		J 3 Après-midi
		J 4
		J 5
		J 6
		J 7

- ▶ **En cas de reprise des alcoolisations** : informer le médecin, arrêter le sevrage
- ▶ **Les signes de sevrage** : Transpiration, tremblements des mains, insomnies, nausées ou vomissements, hallucinations ou illusions transitoires visuelles tactiles ou auditives, agitation psychomotrice et anxiété.
- ▶ **Les effets secondaires des traitements prescrits** :
 - Benzodiazépines : trouble du comportement inhabituel dangereux pour le patient et ou l'entourage nécessitant l'arrêt du sevrage, amnésie antérograde, confusion somnolence, trouble de l'équilibre.
 - Vitamine B1 : prurit, éruption cutanée