



## NOS COORDONNÉES

**GAFC**  
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale  
120, route nationale  
BP 100  
39100 DOLE  
Téléphone : 03 84 71 54 20  
E-Mail : [contact@ga-fc.fr](mailto:contact@ga-fc.fr)  
Site internet : [ga-fc.fr](http://ga-fc.fr)

Propulse



## RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

1. ACAMPROSATE

2. BACLOFÈNE

**3. DISULFIRAME**

4. NALMÉFÈNE

5. NALTREXONE

## PRESCRIPTION DE NALTREXONE (REVIA®) EN MÉDECINE DE VILLE

La naltrexone a été initialement mise sur le marché comme traitement de soutien en consolidation après une cure de sevrage aux opiacés, sous le nom commercial de NALOREX®.

Après dix ans de prescription aux Etats-Unis, il a montré un profil d'innocuité très favorable. A partir de 1992, la molécule a été approuvée comme traitement de soutien dans le maintien de l'abstinence après sevrage de l'alcool chez les personnes alcoolodépendantes. Sa mise sur le marché s'est faite sous le nom commercial de REVIA® en 1996.

L'action de la naltrexone conduisant à une réduction de la libération de dopamine, se traduirait par une diminution des effets de plaisir et de récompense de l'alcool. Le traitement ne peut être institué qu'après la phase de sevrage alcoolique.

.....

## POSOLOGIE

La posologie est d'un comprimé de 50 mg par jour pour une durée de traitement de trois mois au moins.

## CONTRE-INDICATIONS

- ◆ Age : Les sujets de plus de 60 ans ;
- ◆ Insuffisance hépatocellulaire sévère, hépatite aigüe ;
- ◆ Etat de dépendance aux opiacés (il est donc important de s'assurer de l'absence d'opiacés par une recherche urinaire) ;
- ◆ Prise de traitements par opiacés ou apparentés ;
- ◆ Une période de sevrage de 7 à 10 jours doit être respectée avant le début du traitement.

Une surveillance des fonctions hépatique et rénale doit être effectuée en cas d'insuffisance hépatique ou rénale.

L'utilisation de la naltrexone n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse mais son utilisation devra être interrompue en cas de prescription d'antalgiques opiacés. Elle est contre-indiquée pendant l'allaitement.

La tolérance de la naltrexone est généralement bonne, les seuls effets indésirables rapportés sont mineurs (céphalées, nausées).

La naltrexone semble réduire modestement le craving, mais surtout elle fait ressentir moins d'effets agréables lors de la consommation d'alcool.

L'association acamprosate naltrexone peut être envisagée en particulier en cas ré-alcoolisation.

*Il est nécessaire d'intégrer ce traitement dans le cadre d'un suivi psycho-social.*